

الفصل الحادي عشر: الوقائع الطبية العدلية ذات الطابع الجنسي

1


القضايا الطبية القضائية ذات الطابع الجنسي ترد الى الدوائر الطبية العدلية في العراق لواحدة من الاسباب التالية

1. الاصابات العارضية في المنطقة التناسلية وبخاصة عند الاناث من الاطفال.
2. الشك او التشكيك في عذرية انثى عند الزواج, او اثر هروب او اختطاف او تغيب مشبوه.
3. قضايا الزنا والاعتصاب وحالات اللواط, وماينتج عنهما فورا او لاحقا .
4. قضايا اتهامات العنة والعقم.
5. حالات الحمل المشتبه به , و حالات الاسقاط الجنائي, وحالات الولادة سفاحا , ونزاع البنوة.

من الواجب على الطبيب الفاحص ان يلم الماما ولو يسيرا بتشريح المنطقة التناسلية (الاستحيائية) عند الانثى, والتي تضم **الفرج و الشرج وما بينهما**, وان يعرف احوال غشاء البكارة في الحالات الاعتيادية وما يحصل فيه عند حدوث ضرر او حصول واقعة جنسية.

Female External Reproductive Organs

(2)



الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

متطلبات واداب الفحص الطبي للوقعات الجنسية

يتطلب فحص الوقائع الطبية ذات الطابع الجنسي الامور التالية

- 1- التثبت من سلامة الارسال من قبل الجهات التحقيقية اصوليا
- 2- الالمام بظروف الحادث من خلال كتاب طلب الفحص او من ذوي الضحية
- 3- تحديد المطلوب من الفحص
- 4- تثبيت وقت الواقعة وتاريخها وكل ما يرد في الادعاء من نقاط
- 5- تهيئة ما يحتاج اليه الطبيب من ادوات طبية للفحص ويستدعي الممرضة
- 6- افهام المفحوصة بطبيعة الفحص وكيفيته ومن سيشارك فيه وطلب من احدى ذوي المفحوصة البقاء معها. ثم يطلب من الممرضة اعداد مستلزمات الفحص ثم يباشرفحص.

تضطلع المفحوصة عند الفحص بواحدة من وضعيتين

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

وضع الرقود النسوي، وهو ان تستلقي الانثى على طاولة الفحص على ظهرها ويدها تحت 1. راسها ثم تعلق الممرضة الطرفين السفليين للمفحوصة عند الركبتين بمسند ثابت وحملات على جهتي طرف الطاولة القريب من الطبيب، بحيث تكون المنطقة الحيائية بمستوى حافة الطاولة. وهذا الوضع هو المألوف في فحص اغشية البكارة

وضع السجود، حيث يكون المرفقان قرب الركبتين ويكون العجز الى الاعلى. ويفضل هذا 2. الوضع عندما يراد فحص غشاء البكارة والاست في ان واحد

تقوم للممرضة في هذه الاثناء باعداد ادوات الفحص وتجهيز الشرائح لاخت المسحات

كيفية اجراء فحص البكارة: يباشر الطبيب الفحص بان يلاحظ وبدقة ظاهر الفرج والتأكد من عدم وجود اضرار جرحية مهما كانت بسيطة، او اجسام غريبة او بقع مميزة او شعرات غريبة. بعد الفراغ من ذلك يمسك الطبيب الفاحص بابهام وسبابة احدى يديه الشفر والاسكت على الجهة التي تقابل هذه الاصابع ويسحبها اليه والى الجانب بحيث ينفسح له المجال لمسك الشفر والاسكت على الجهة المقابلة بابهام وسبابة اليد الاخرى وبعد الفراغ من الفحص يعيد الطبيب المفحوصة الى الشخص المرافق لها او الذي جاء بها من الجهة التحقيقية

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

يباعد ما بين الجهتين حتى يتوتر نسيج الغشاء وما يحيط به فيشاهد الطبيب صفات الغشاء الاربع مارة الذكر ثم يتثبت من وجود او عدم وجود ضرر في الشفرين والاسكتين وما بينهما. وان وجدت الانثى مفتضة فيصف التمزقات وموضعها ومدياتها. وما اذا كانت التمزقات قديمة او حديثة

اذا وجد الطبيب ان التمزقات حديثة, او طلب منه المحقق تحريمني في الفرج او المهبل فيأخذ مسحة من المنطقة بعد ان يبيل القطنه التي على راس المسبر بماء مقطر ثم يمسح بها جدران المهبل او ظاهر الفرج في الثنيات الموجودة ما بين الشفرين والاسكتين وفي الحفرة الزورقية وكل منطقة يراها الطبيب تستحق المسح. بعد ذلك ينقل الطبيب المسحة الى شريحة زجاجية يتم ارسالها بعد تجفيفها وتغليفها الى الجهة ذات العلاقة وفق الاصول المتبعة في ارسال المسحات. . بعد ذلك يقوم الطبيب بتثبيت مشاهداته وما قام به من اجراءات في مسودة او على ظهر كتاب طلب الفحص حتى ترد الاجوبه فيحرر صورة الجواب لطبعها وارسالها الى الجهة طالبة الفحص

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

الفرج: الفرج عند الانثى يشمل **الركب (جبل الزهرة) , والشفران الكبيران , الاسكتان (الشفران الصغيران) , البظر , وغشاء البكارة**.

الركب هو منبت شعر العانة, ويكون مثلث الشكل قاعدته الى الاعلى ورأسه يندمج بالشفرين. ويتكون من جلد يحتوي غدا عرقية وزهمية, يليه نسيج شحمي لا يختلف عن النسيج الشحمي تحت الجلد في مناطق الجسم الاخرى

الشفران الكبيران وهما يقابلان الصفن عند الذكر. وهما طيتان من الجلد طوليتان تمتدان من اسفل الركب وتتحدان مع الفتحة السفلية **للفلج الحيائي** من الجانبين. ولكل شفر وجهان: **خارجي** وهو جلد يحتوي على خلايا صباغية واجربة شعرية, و**باطني** رقيق ناعم الملمس يحتوي غدد زهمية تعمل افرازاتها على **ترطيب الفلج الحيائي وتجعله لزجا**. يحتوي كل شفر على زائدة شحمية مغلفة بنسيج هلي يجعلها مستقلة عما حواليتها وعند هذه الزائدة ينتهي الرباط الرحمي المستدير.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

يلتقي الشفران في قسمهما العلوي الامامي عند الركب وهما اسمك ما يكونان, ثم يضمحلان في قسمهما السفلي الخلفي حيث يلتقيان عند **العويشكة (الشوكة)** في **منطقة العجان** (وهي المنطقة المحصورة ما بين الشوكة و الإست , طولها 2.5-3سم). **يؤدي هزال الجسم ودوام المواقعة الجنسية وتكرار الولادة وتقدم العمر الى ضمور الشفرين الكبيرين** حيث يبدوان متباعدان ويبديان ما بينهما عند الولودات والهزيلات , ومتقاربان يغطيان ما بينهما عند الابكار. **يوجد في الشفرين الكبيرين غدد وعروق واعصاب اضافة الى عضلات تشبه عضلة السلخ في كيس الصفن بالاضافة إلى غدتي بارثولين (الكينين) الاسكتان (الشفران الصغيران):** وهما عبارة عن ثنيتين جلديتين صغيرتين مثلثتي الشكل تقعان ما بين الشفرين الكبيرين. تلتقي الاسكتان في الاعلى **فوق وتحت البظر** مكونتين **قلفة البظر**, ويلتقيان عند متوسط القسم الخلفي للفتحة المهبلية السفلى مكونتان بروزا جلديا دقيقا يسمى **العويشكة (الشوكة)**

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

تنعدم الاجربة الشعرية في الاسكتين ويضمحل النسيج الشحمي. **يضم نسيج الاسكتان عروقا دموية غزيرة وشبكة كثيفة من الاعصاب الحسية يجعلهما مرهفتي الحس للمس الرقيق.** تقع فتحة غدة بارثولين(الكين) في متوسط الوجه الانسي لكل من الاسكتين خارج حدود غشاء البكارة


الدھليز (الفلح الحيائي) ويقع ما بين الاسكتين من الجانبين ويحده من الامام والاعلى البظر ومن الاسفل والخلف الشوكة. **يفتح في الدھليز كل من الاحليل وسط الصماخ البولي، والمهبل من خلال غشاء البكارة.** تنتشر ما بين هاتين الفتحتين الغد الدھليزية والتي تفرز مادة مخاطية. ما بين الجزء الخلفي-السفلي لغشاء البكارة والشوكة تقع **الحفرة الزورقية.**

البظر. وهو عبارة عن الجزء الذي يقابل القضيب عند الذكور لكنه يتميز عن القضيب في **صغر حجمه وعدم مرور الاحليل في متوسطه بالاضافة الى انه لا يحتوي على الجسم الاسفنجي.**

غشاء البكارة انواع اغشية البكارة



غشاء البكارة



الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

غشاء البكارة. (القضة, او عذرة المرأة, او ستر البكارة). وهو العضو الذي يحد المهبل في اسفله وعند انفتاحه في الدهليز. **ويتكون الغشاء من طبقتين من النسيج القشري الظهاري يضمن بينهما طبقة من نسيج ليفي مرن مع اوعية دموية دقيقة ونهايات عصبية.**

تصنيف اغشية البكارة. تصنف اغشية البكارة تبعا الى : **1. شكل فتحة الغشاء . 2-** اوصاف حافته الحرة . **3- سمك بنيته . 4- سعة فتحته**

شكل غشاء البكارة . و يتعين تبعا لوجود فتحة واحدة او فتحتين او اكثر او ان تنعدم **1-** الفتحة منه. فإذا كان نسيج الغشاء متكامل النمو من جميع جهاته سمي **الغشاء حلقيا (طوقيا او دائريا).** **و** اذا انعدم نمو الغشاء في المنطقة التي تلي الصماخ البولي فان الغشاء يصبح على **شكل حرف النون او نعل الفرس,** وهذا النوع هو اكثر انواع الاغشية شيوعا. اما اذا انعدم نمو الغشاء في نصفه العلوي بحيث لايتعدى النصف السفلي من فتحة المهبل فان الغشاء يكون **شبيها بالهلال (هلاليا) وهو من الاغشية النادرة**

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

فاذا وجدت في الغشاء فتحتان يفصل بينهما جسر من نفس النسيج سمي **الغشاء جسرياً**. وان زادت عن فتحتين سمي **الغشاء غربالياً**. واذا انعدمت الفتحة سمي **الغشاء ارتقا**

حافة غشاء البكارة. يتم تحديد نوع الحافة من خلال الفحص بعد ابعاد الاسكتين **2**. والشفرين الى الجانبين. فاذا كانت الحافة ملساء (منتظمة) سمي **الغشاء منتظم الحافة** وهو النوع الغالب في اغشية البكارة التي يتم فحصها في الطبابات القضائية في العراق. وقد تكون **الحافة مشرشرة او متعرجة او مسننه**. وقد تجتمع صفتان من هذه الصفاة في حافة حرة واحدة.

بنية غشاء البكارة. تتراوح بنية غشاء البكارة ما بين البنية الرقيقة التي يغلب مشاهدتها **3**. عند الاطفال وفي بعض البالغات, والبنية السميقة. **اما البنية شائعة الحدوث فهي البنية المعتدلة او السوية والتي يتراوح سمكها ما بين 1-2 ملم..** وهناك شواذ كالبنية اللحمية والغضروفية او العظمية

سعة فتحة الغشاء. سعة الفتحة في الغالب تكون معتدلة بحيث تسمح بمرور الاصبع **4**. **الخنصر من خلالها دون ان يتمزق الغشاء**

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

فاذا كانت لاتسمح بمرور اصبع الخنصر اعتبرت ضيقة, وقد تكون الفتحة بسعة راس الدبوس. **وقد تكون الفتحة واسعة بحيث تسمح بمرور اصبعين من خلالها دون ان يتمزق الغشاء**

وهنا تجدر الاشارة الى التمييز بين غشاء واسع الفتحة **والغشاء المطاطي**: فالغشاء المطاطي يكون اعتيادي سعة الفتحة او ضيقها ولكنه لا يتمزق عند ايلاج اصبعي السبابة والوسطى وبالتالي القضيب المنتصب اثناء المواقعة او المواقعات الجنسية, **وهذا النوع من الاغشية نادر جدا**. اما ما يسجل من اغشية مطاطية في وقائع الفحوص اليومية فهي في الواقع **اغشية واسعة الفتحة (عيانا) تسمح بمرور اصبعي السبابة والوسطى**, وقد يكون مرد سعة الفتحة هو التلذذ الاصبعي الذاتي. وفي العادة يسمح مثل هذا الغشاء بالايلاج القضيبى اثناء المواقعة الجنسية, حتى اذا تكررت مرات عديدة, بدون ان يتمزق الغشاء. **ان اكثر الاغشية شيوعا في العراق هي الاغشية نونية الشكل, معتدلة سعة الفتحة, منتظمة الحافة, ومعتدلة البنية**

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

14



الصورة رقم (٢)

غشاء بشكل حلقي، منتظم الحافة، متوسط الفتحة، سميك لحمي القوام وهو غير ممزق.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

15



الصورة رقم (٣)

غشاء بشكل حلقي، منتظم الحافة، متوسط الفتحة، سميك القوام وهو غير ممزق.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

16



الصورة رقم (٤)

غشاء بشكل نعل الفرس، منتظم الحافة، متوسط الفتحة، اعتيادي القوام وهو غير ممزق.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

17



الصورة رقم (٥)

غشاء بشكل حلقي، مشرشر الحافة، واسع الفتحة، اعتيادي القوام ويلاحظ وجود الخليج (Notch) في الساعة (٩).

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

18



الصورة رقم (٦)

غشاء بشكل حلقي، مشرشر الحافة، واسع الفتحة، سميك القوام وهو غير ممزق.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

19



الصورة رقم (١٢)

غشاء بشكل جسري، ذو فتحتين متساويتين تقريباً، وقوام سميك، وهو غير ممزق.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

20



الصورة رقم (١١)

غشاء بشكل غربالي، ذو ثلاث فتحات ضيقة، وقوام سميك لحمي، وهو غير ممزق.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

نتائج المواقعة الجنسية

تنتهي المواقعة الجنسية الاعتيادية مع البكر باحد الامور التالية

افتضاض (تمزق) غشاء البكارة , وهو ما يحصل في الغالبية العظمى من **1-** الوقائع في الأحوال الاعتيادية

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

لايحصل الافتضاخ وانما ينتهي الامر بالدفق المنوي والذي قد لا يصل **2-** سطح الفرج, أو يصله ولكنه لا يدخل المهبل, أو انه قد يصل المهبل ومنه تصل الحيامن إلى الرحم.

..الدفق المنوي. والذي قد يسبب إخصاب البيضة وما ينتج عن ذلك **3-**

الحبل و الاسقاط او الولادة 4.


الافتضاخ أو افتراع البكر. يتمزق غشاء البكارة نتيجة إيلاج القضيب المتعظ أو **1-** ما يشبهه ومتى ما فاق الإيلاج قابلية الغشاء على التمدد والمقاومة فانه يتمزق. **يحصل التمزق عادة في متوسط القسم العجاني (السفلي) من الغشاء,** والسبب في ذلك يعود إلى افتقار هذا القسم من الغشاء إلى المسند العظمي, على عكس

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

القسم العلوي(الصماخي) والذي يكون مسندا بالعظم العاني. و قد يحصل التمزق في أكثر من منطقة واحدة

يمتد التمزق من الحافة الحرة للغشاء حتى منطقة ارتكاز الغشاء, أي نقطة اتصاله بالمهبل أو أي من الاسكتين أو الحفرة الزورقية. **وهذا النوع من التمزق يسمى تمزقا تاما.** قد يحصل تمزق جزئي في الغشاء يشمل فقط الحافة الحرة منه وجزءا من نسيجه دون أن يصل قاعدة ارتكاز الغشاء. **إن الجرح الذي يحصل نتيجة تمزق الغشاء هو جرح رضي حيث نشاهد حافته المشوشة عند فحصه العدسة المكبرة**

يترافق التمزق بنزف دموي والذي لا يتجاوز البضع قطرات من الدم في الأغشية المعتدلة. يكون النزف ضئيلا في الأغشية الرقيقة وغزيرا في الأغشية السميكة



الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

في بعض الأحيان قد يترافق التمزق **بكدمات في المناطق المجاورة لقاعدة الغشاء** ويمكن من خلال متلونات هذه الكدمات تحديد الزمن المنقضي على التمزق

اندمال تمزق الغشاء. بعد مضي بضع ساعات على التمزق تنضح حافتا التمزق سائلا مصليا مدمي ثم تبدأ ان بالاحتقان والتوذم إيدانا ببدء العملية الاندمالية. بعد اليوم الاول او اليومين يتوقف النصح المصلي وتستمر العملية الاندمالية لبضعة أيام. **يكتمل اندمال الغشاء باندمال كل حافة على حدة خلال 10 أيام أو 15 يوم الى ابعد احتمال.** وفي اغلب الأغشية الاعتيادية يتم الاندمال خلال أسبوع واحد. عند اكتمال الاندمال تبقى حافتا التمزق متباعدتان ويكون لونهما متجانسا مع لون الغشاء وفي بعض الاحيان نجد بعض من انسيج الليفي يتسبب في سمك حافة التمزق. والسبب في بقاء حافتا التمزق متباعدتان يعود إلى: 1. الشد العضلي للعضلات المحيطة بفتحة المهبل وعضلات أرضية الحوض , 2. وحركة الطرفين السفليين الدائمة, 3. و الافرازات المهبلية المستمرة , 4. وطبيعة مكونات نسيج الغشاء

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

تتميز الإصابات العارضة في المنطقة التناسلية للأنثى عن تلك المحدثه جنسيا بأن الأولى تتناول أجزاء من المنطقة التناسلية المجاورة لغشاء البكارة دون أن تمتد إليه. **ونادرا ما تقترن الإصابة العارضة بضرر في الغشاء نفسه، و اندر من ذلك أن يتضرر الغشاء لوحده بمثل هذه العوارض.** و الأضرار العارضة إن أصابت الغشاء فإنها يجب أن تكون امتدادا للإصابات النسجية في المناطق التي تقع أمامه أو حوله. إن أهمية فحص غشاء البكارة في الإصابات العارضة يكمن في الجانب الاجتماعي و للتأكد من سلامة الغشاء ودوام عذرية الفتاة المصابة عرضا في المنطقة التناسلية.

إن الألم المرافق للافتضاخ هو الم بسيط ولكن القلق النفسي والتوتر العضلي والخوف يفاقانه. يبقى الألم بسيطا ثم يستمر ليومين ثم يزول

أما الالهراق أو الدفق المنوي فيحصل في القبو الخلفي من المهبل بانتفاضات متتالية يهرق معها المنى بكمية معدلها 3-6سم³

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

يسيل القسم الأكبر من المنى إلى الخارج مع استئلال القضيب من المهبل عند انتهاء العمل الجنسي فتتلوث به حواف غشاء البكارة والفرج والعجان، وقد يسيل الى المنطقة الاستتية. ولو وجدت أغطية أو ملابس قريبة من المنطقة التناسلية، الذكورية أو الأنثوية، فإنها ستتلتوث بالمنى. و إذا ثبت مختبريا وجود المنى في المسح المأخوذة من المهبل والفرج في الوقت المناسب فان ذلك يعتبر دليلا أكيدا على حصول الجماع عند الثيب، ويعزز افتضاض البكر، بل يؤكد كون افتضاضها نتيجة الواقعة الجنسية.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

28



الصورة رقم (١٤)

غشاء بشكل نعل الفرس، منتظم الحافة، واسع الفتحة، اعتيادي القوام، وهو ممزق في الساعة (٦ أو ٣).

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

29



الصورة رقم (١٥)

غشاء بشكل حلقي، مشرشر الحافة، واسع الفتحة، اعتيادي القوام، وهو ممزق في الساعة (٧).

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

حصول المواقعة الجنسية مع البكر بدون ان يتمزق غشاء البكارة. وقد يحصل 2.

ذلك في احيان قليلة وفي الاحوال التالية

ا- حصول المواقعة **دون الايلاج التام** للقضيب داخل المهبل

ب- حصول الايلاج القضيبى ولكن الغشاء لم يتمزق **لكون نسيجه مطاطيا**, او انه ذا فتحة واسعة جدا

ت- حصول الايلاج القضيبى ولكن **القضيب المنتعظ صغير الحجم مقارنة بقطر فتحة الغشاء** على الرغم من كون الغشاء اعتيادي الهيئة او اوسع الفتحة

ففي هذه الحالات تتم المواقعة الجنسية ويحصل الاهراق المنوي, وقد يفضي الامر الى الحمل او عدوى جرثومية وهو امر نشاهده بين الحين والآخر في بعض قضايا غسل العار عندما تكون الانثى حاملا بجنين في الاشهر المتقدمة من الحمل وغشاء البكارة لايزال غير ممزق.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

الالتهاب او الخمج. من نتائج المواقعة قد تنتقل العدوى الجرثومية التناسلية **3.**

من الذكر المصاب بها الى الانثى او بالعكس. وهذه العدوى ان شخصت فانها تشير بشكل او اخر الى حصول المواقعة الجنسية. وقد يتمكن الطبيب من تحديد زمن حصول الوقاع الجنسي من خلال تطور سير الافة. من اهم الافات التناسلية

السيلان : هو من الامراض المعدية و التي تنتقل خلال المواقعة الجنسية, ويظهر **1-**

بدوره الحاد بعد يومين والعشرة ايام, وبصورة عامة بعد اقل من خمسة ايام. ويظهر عند الانثى البكر ان شكت من اعراض كحرقة عند التبول او الم في الفرج. ويندر ان تلاحظ الانثى سيلان القيح

ب- السفلس. مرض معدي تناسليا سببه اللولبيات الشاحبة. تتراوح فترة الحضانة

بين 9-90 يوما ومعدلها 10-20 يوما. يتميز هذا المرض بثلاث ادوار

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

دور التقرح الابتدائي الصلب في منطقة الاتصال ما بين الجرثومة من الذكر وجلد الأنثى. ويظهر التقرح عند الأنثى في منطقة الشفريين والاسكتين والبطر او الشوكة او حول المنطقة الاحليلية. وقد يوجد التقرح في عنق الرحم. يستمر دور التقرح الأولي من شهر واحد إلى شهرين

دور الطفح السفلسي ويتميز بحبيبات ونفط حمراء بنية لامعة تنتشر في كافة أنحاء الجسم ولا تترافق بحكة أو هرش. ويستمر هذا الدور من شهر واحد إلى بضعة شهور أو حتى سنة

دور العلامات المتأخرة وهو من الإعراض المتأخر للمواقعة الجنسية حيث يظهر بعد سنة أو أكثر. يتميز بظهور عقد حبيبية كبيرة تنتشر بشكل انفرادي تحت الجلد وقد تتقرح في بعض الأحيان. وفي أحيان أخرى تتحد أكثر من حبيبة واحد لتكون وربما قد ينفتح إلى الخارج أو الداخل على شكل قروح مملوءة بمادة تشبه الجبن. تشخص آفة السفلس بالفحص السريري

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

والفحص المجهرى لإظهار الجرثومة المسببة للآفة في الدور الأول، وبفحوص الدم في الأدوار المتأخرة

ج- القرع الرخو: من الأمراض التناسلية المعدية تسببها عضية دوكري. ويظهر المرض على هيئة قرع يحدد نفسه موضعيا في المنطقة التناسلية او في موضع التلوث، بعد فترة حضانة امدها 3-5 يوم. والقرع لين الملمس الأمر الذي يميزه عن قرع السفلس الابتدائي الصلب. غالبا ما يترافق القرع الرخو بالتهاب وتضخم العقد اللمفاوية المجاورة. الفحص السريري وتحري عصيات دوكري في القرع كفيلا بتشخيص المرض

د- الثآليل الزهرية: الثآليل ذات طبيعة واحدة ومردّها نفس الفيروسات التي تسبب الثآليل في مناطق أخرى. ومظهر الثآليل ومدى انتشارها يعتمد على مقدار الرطوبة الموجودة في المنطقة المصابة. تتموضع الثآليل في سطح الفرج ولكنها قد تنتشر إلى المهبل أو عنق الرحم

Syphilitic chancre

القرحة الصلبة للسفلس



Syphilitic chancre

القرحة الصلبة للسفلس




الطور الثانوي للسفلس، الطفح الجلدي خاصة في راحة اليدين



القرحة الزهرية الرخوة

Soft chancre or chancroid





الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

الحمل و الإسقاط و الوضع .4

الحمل. من أهم نتائج الموقعة الجنسية هو الحمل, وللحمل علامات افتراضية وعلامات مؤكدة. من العلامات الافتراضية انقطاع الحيض, والوحام, وانتفاخ البطن, وكبر حجم الثديين واندفاع اللبء منهما, وظهور الخط الأسود الشاقولي في متوسط البطن, وغمق لون هالة الثدي. ومن العلامات السريرية الافتراضية سماع حفيف سريان الدم في الشرايين الرحمية. **إما العلامات الأكيد للحمل والتي غالبا ما تظهر واضحة بعد الشهر الثالث فهي: تلمس أجزاء الجنين والتسمع لدقات قلب الجنين وتميزها عن دقات قلب الأم و تصوير الهيكل العظمي إشعاعيا والنتيجة الموجبة للفحوصات الهرمونية.** إذا تم تشخيص الحمل فان تطبيقاته الطبية:

القضائية تتضمن ما يلي

كونه علامة أكيدة لوقوع الجماع الجنسي بين الذكر والأنثى 1.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

تحديد الزمن التقريبي لوقوع الجماع الجنسي وذلك اعتمادا على مدة الحمل -2
او عمر الجنين

تستفيد الأنثى في تأجيل إثبات البتة إلى ما بعد الوضع. وما يتعلق بها 3.
من ارث

يؤجل قضايا الطلاق ويؤخر تنفيذ حكم الإعدام بالحامل لما بعد الوضع 4.

الوضع.

هو عملية اخراج او خروج ناتج الاخصاب قبل الاوان, او في موعد الولادة, او
بعد موعد الولادة عبر المسالك التناسلية. ان كل وضع يحصل قبل انتهاء
الشهر السابع من دورة الحمل يعتبر إجهاضا او إسقاطا, وان حصل الوضع بعد ذلك
ولكن قبل اكتمال الشهر التاسع من مدة الحمل اعتبر ولادة مبكرة او قبل الأوان

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

الإجهاض (الإسقاط). يعرف على انه وضع محتويات الرحم الناتجة عن الإخصاب مجتمعة، او على هيئة أجزاء، بوقت يكون فيه الجنين المجهض غير مكتمل الخلقة وغير قادر على العيش لوحده مستقلا عن الرحم. أنواع الإجهاض عديدة ولكنها تقع ضمن مجموعتين رئيسيتين

الإجهاض التلقائي : وهو على عدة أنواع منه الذي يحصل للمرأة المسقط، 1. والإسقاط المهدد، والإسقاط الذي لا بد منه، و الإسقاط الفأنت. والسبب في أي من الحالات الأنفة الذكر إما أن يكون مرضا عضويا رحميا أو مرض عضوي عام عند الأنثى. أو أن يكون السبب عيبا خلقيا في الجنين نفسه أو في المشيمة أو في الأغشية الجنينية

الإجهاض المحدث. وهو الإجهاض الذي يتم بكيفية **عارضيه أو علاجية أو 2. جنائية.** فالعارض منه هو ما يحصل نتيجة لإجهاد عضلي شديد أو مرض أو

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

رض شدشد عارض على اسفل البطن. **والاجهاض العلاجي** هو الذي ينجز لغرض الحفاظ على حياة الام بعد ان يتأكد الطبيب من وجود خطر على حياتها وحياة الجنين اذا ما استمرت حالة الحمل حتى نهاية مدته. وامثال هذه الحالات معروفة لدى الاطباء ويبيحها القانون, لان الاجهاض سيحفظ حياة الام بدلا من خسران حياة الاثنين فيما لو لم يتم الاجهاض. وتقرير وجوب الاجهاض المرضي يجب ان يتم عن طريق لجنة طبية تؤكد فيه اصابة الام بآفة مرضية تتعارض واستمرار الحمل كمرض في القلب او صماماته. **اما الاجهاض الجنائي** فقد يتم من قبل الام نفسها باي وسيلة ممكنة, او من قبل آخرين وخصوصا ممن لهم المام بسيط بالامور الطبية, او من قبل ذوي المهن الطبية كالاطباء والصيادلة والقوابل والممرضات. او ان يحصل الاجهاض اثناء المشاجرات بشكل متعمد. ان القوانين العقابية ومنها القانون العراقي تعاقب الانثى التي تجهض نفسها او من يجهضها برضاها او بدون رضاها او عمدا عقوبات متباينة

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

ويعاقب الطبيب بحرمانه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إضافة إلى عقوبة السجن أو الغرامة إن هو قام بإجهاض أنثى بدون رضاها

:الإجهاض الجنائي يتم بوحدة من الطرق التالية

1. استخدام العقاقير المجهضة. وهي معروفة لدى الأطباء وذوي المهن الطبية. الأخرى.

2. استخدام المحاقن لحقن مواد مخرشة أو مقرحة لبطانة الرحم إلى الرحم مباشرة، وأكثرها شيوعا المحاليل الصابونية

3. استخدام الآلات بتسليطها على أسفل البطن، وهي على أنواع، منها الآلات

الراضة كقبضة اليد والعصي والقضبان المعدنية وما شاكلة والمسلطة على أسفل البطن بشكل عنيف مبرح كما يحصل في المشاجرات. والرض قد يكون موجها الى الرحم مباشرة وذلك بادخال انايب مطاطية او معدنية الى الرحم مباشرة من

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

خلال عنق الرحم بغرض تمزيق الاغشية الجنينية وقتل الجنين. **ان الغاية من ادخال هذه الالات وتمزيق الاغشية الجنينية هو جعل الاجهاض يتم بكيفية تشابه عملية الوضع الطبيعية.** ومن اسلم طرق الاجهاض واكثرها شيوعا **هي عملية تجريف الرحم** والتي تنجز بيد طبية فنية متخصصة. يتم جرف الرحم عادة تحت البنج العمومي, ثم يباشر بتوسيع قناة عنق الرحم بموسعات معدنية متدرجة حتى يتسع المجال للمجرفة بالدخول من خلال عنق الرحم وعندها تجرف محتويات الرحم كلها بما فيها الجنين والسخذ.

اختلاطات الاجهاض الجنائي: 1. التسمم بالعقار المجهض اذا كانت الجرعة المستعملة كبيرة. 2. الخمج الموضعي او العمومي. 3. الانصمام الهوائي. 4. النهي العصبي نتيجة الالم المبرح. 5. النزف الدموي والقصور الكلوي

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

إجراءات الفحص في وقائع الاجهاض الجنائي

1. استلام طلب بالفحص مرفقا بحيثيات الواقعة وظروفها.
2. تثبيت المظاهر الخارجية على الانثى والتي تدل على حصول الحمل وذلك بحضور ممرضة.
3. تسجيل المشاهدات الخارجية والتي تعزز حصول الاجهاض كشحوب الوجه وضعف البنية والوهن.
4. فحص البطن والمناطق التناسلية على سرير الفحص و ملاحظة علامات الحمل والشدة الخارجية على جدار البطن ان وجدت.
5. جس الرحم وتحديد مستواه بالنسبة للركب.
6. فحص الفرج ما به من اضرار , و ما اذا كان يسيل منه سائل ام لا, ولون السائل.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

7. فحص غشاء البكارة وتثبيت ما اذا كان ممزقا ام لا , وما اذا كان حديثا ام قديما .
8. ان وجد غشاء البكارة ممزقا يفحص عنق الرحم باستعمال منظار المهبل ومشاهدة عنق الرحم وما به من كلوم او تمزقات. يستفيد الطبيب من الحالة الاندماجية لمختلف كلوم عنق الرحم والمهبل او التغيرات اللونية الكدمية في تقدير الزمن المنقضي على الإجهاض او الوضع

بعد اكمال الفحص يستحصل نموذج من ادرار الانثى في انبوب اختبار نظيف .
9. لاجرا اختبار تحري الحمل ان كان الاجهاض قد تم منذ فتر لاتزيد على الاسبوعين

الولادة قبل الأوان والولادة في ميعادها.

يختلف مظهر الانثى الوالدة حديثا عن المجهضة بما يلي: 1. ارتفاع قمة الرحم في البطن عند الانثى الوالدة لتوها يكون بمنتصف المسافة ما بين السرة والركب و

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

- اوطاً من ذلك عند الانثى المجهضة. وتكون قمة الرحم بمستوى العانة او خلفها في اليوم الثاني عشر التالي للولادة بحيث لا يستطيع الطبيب جسّه من البطن
- السائل النفاسي الذي ينزل بعد الولادة يكون اغزر عند الوالدة بميعادها من ما 2. عند الانثى المجهضة ويستمر لفترة اطول
- الاضرار الكلمية في عنق الرحم والمهبل وغشاء البكارة والعجان تكون بدرجة اشد 3. عند الوالدة في ميعادها

قتل حديث الولادة

قد تلجأ الام بنفسها او بمساعدة الاخرين او ان توصي بقتل وليدها عند ولادته مباشرة او بعد ذلك ببسير, خصوصا ان كانت حملت به سفاحا, اتقاء للعار. نصت المادة 407 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على انه ليتوافر .: القصد الجنائي لجريمة قتل الام وليدها حديث العهد بالولادة يجب ان يكون

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

1. ان يكون القتل وليدا حديث عهد بالولادة لاجهيزا .
2. المقتول قد ولد حيا ولم يكن قد ولد ميتا .
3. هناك فعل ايجابي او سلبي من الام يقضي على حياته .
4. القتل اتقاء العار .

وكل هذا يتطلب معرفة عمر الجنين و التمييز بين الجهيز والمولود قبل اوانه والذي يولد بموعده. يعتمد الطبيب على طول الجنين لتقدير عمره في الحياة الرحمية. فقد جرت العادة على اخذ الجذر التربيعي لطول الجنين ان كان دون الـ 25 سم ليبدل على عمره بالشهور, فاذا كان طوله 9 سم- مثلا- فانه يكون قد اتم الشهر الثالث من الحياة الرحمية وهكذا. وان زاد طول الجنين عن 25 سم فان العمر يكون ناتج قسمة الرقم على 5, فاذا كان طول الجنين 35 سم- مثلا- فان عمره 7 شهور رحمية

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

فان تجاوز طول الجنين الـ 35 سم دل ذلك على قدرته او امكانيته على العيش مستقلا عن الرحم. يبلغ طول الذي يولد في اوانه 45-50 سم كمعدل، ووزنه بحدود 1200-5750 غم، مع غياب الزغب من الجسم. ومن المظاهر الاخرى لاكتمال النمو نزول الخصيتين الى الصفن، او اكتمال مظهر الفرج الانثوي، وامتداد العقي من الاعور او اسفل الامعاء حتى الاست. ويكون طول شعر فروة الراس بحدود 2.سم

علامات تشخيص حديث الولادة. 1. مظهر الجثة العام وما اذا كانت عارية او عليها ملابس وما اذا كانت الجثة مغسولة او ان طبقة البنريق الجبني لاتزال عالقة في الجلد.

هيئة الحبل السري وما اذا كان لايزل متصلا ام انه مقطوع ومربوط بشكل اصولي و 2. ما اذا كانت حافته الحرة جافة ام لاتزال رطبة

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

علامات الولادة الحية. بعد تشخيص حادثة الولادة يجب التأكد من كون الجنين قد ولد حيا. واهم علامات الولادة الحية: 1. **حيوية الحافة الحرة للحبل السري** من خلال التفاعلات الاندماجية فيها

تنفس الرئتين: ويتم معرفة ذلك من خلال المظهر العياني والمجهري للرئتين. 2. وعلى الاختبار المائي. الرئة المتنفسة تبدو بلون وردي وملمسها شبيه بالاسفنج، اما الرئة غير المتنفسة فتكون صغيرة الحجم ولونها احمر غامق شبيها بلون الكبد. اما المظهر المجهرى فيتمثل بتوسع الحويصلات الرئوية في الرئة المتنفسة. اما الاختبار المائي فهو عبارة عن تعويم الرئة بالماء في وعاء واسع . فاذا طفت الرئة فان ذلك دليل على حلول التمدد فيها. اما الرئة التي لا تطفو على سطح الماء تشير الى عدم تمددها. في الرئة المتفسخة يجب ضغط الرئة لاجراء غازات التفسخ منها قبل اجراء اختبار التعويم

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

وجود الهواء في المعدة يدل على ابتلاعه بعد الولادة مع الهواء المستنشق **3.** للرتتين. كذلك وجود الحليب أو اللبا في المعدة يدل على وصول الأول من الحليب. المعد للأطفال و الثاني من الأم بعد الولادة

وجود العقي في الاست بعهد طرده من الأمعاء الغلاظ ويتم ذلك بعد مضي 2-3 يوم **4.** بعد الولادة

سقوط السر ويحصل عادة في حدود 7-10 ايام, وطرده العقي من الأمعاء الغلاظ **5.** وسقوط السر يعتبران من العلامات المؤكدة لحصول الولادة الحية وبقاء الوليد حيا. لوقت طويل أو قصير بعد الولادة

من اسباب وفيات الاطفال حديثي الولادة هو كتم النفس والذي لا يترك في العادة اثرا يدل عليه, واسباب اخرى كالاهمال ويتمثل بعدم غسل الجثة وعدم قطع الحبل السري والنزف الغزير من الحبل السري, والموت من البرد أو شدة الحرارة

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

متلازمة الطفل المعذب: وتنتج عن تعذيب احد الوالدين او زوج الام او زوجة الاب للاطفال ممن هم دون سن العاشرة من العمر. ويتصف كل من الطفل المعذب والشخص الذي يقوم بتعذيبه بصفات نفسانية مميزة. من وجهة النظر الطبية القضائية تتميز هذه المتلازمة بما يلي:

1. هيئة الطفل المعذب تكون رثة في العادة ويكون جلده قدرا نتيجة الاهمال.
2. نحول الجسم او هزاله الشديد بسبب سوء التغذية او اهمالها.
3. لاضرار السطحية تكون متعددة وتقع في نواحي مختلفة من الجسم وبمختلف الالات وفي فترات زمنية متباينة، وهي تشير الى دوام واستمرار الاذى. وقد تشير هذه الاضرار الى الات خاصة كاثار العض والاحزمة والسياط.
4. تعتبر الاضرار العظمية من كسور في الاضلاع والعظام الطويلة المتعددة من اهم المظاهر التشخيصية لهذه المتلازمة.



الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

السبب المباشر للوفاة اما ان يكون رضا شديدا ككسر الجمجمة المترافق بنزف 5. في السحايا او رضوض الدماغ, او بسبب الاختلاطات الخمجية ومنها ذات الرئة

العنة والعقم

العنة, لغويا, تعني عدم مقدرة الذكر على اتيان النساء او عدم اشتهاه الذكر للانثى او عدم اشتهاه المرأة للرجال. وطبيا

قضائيا يقصد بها عدم القدرة على القيام بالوقاع الجنسي ذكرا كان :ام انثى. يرسل المشتبه بكونهم عنيين في الحالات التالية

بناء على طلب الزوجة للتفريق بسبب كون زوجها عينا (المادة 44 - 1 من قانون الاحوال الشخصية العراقي)

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

- 2- بناء على طلب المفحوص نفسه لنفي ابوته لطفل الحق به او نسب اليه
- 3- طلب التعويض المادي لحصول العنة اثر ضرر كلمي كما هو الحال في حصولها
- اثر كسر العمود الفقاري واصابة الحبل الشوكي

اسباب العنة

اسباب العنة اما عضوية جسمانية او نفسانية. و الاسباب العضوية اما ان تكون موضعية او عمومية

:الاسباب الموضعية للعنة عند الذكر

- 1- العيوب الخلقية في القضيب او اعصابه او عدم نموه
- 2- التصاق القضيب بما يجاوره من انسجة اثر تندب حرق او تندب جروح رضية واسعة
- في المنطقة التناسلية

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

- وجود فتق مغبني او فخذى منفرد او على الجهتين جسيم يعيق انتصاب القضيب, -3
- وجود قيلة مائية كبيرة الحجم
- وجود ورم كبير في جورا لقضيب -4

اسباب العنة العضوية الموضعية عند الانثى

- 1- انعدام المهبل او انسداداه او ضئالة تجويفه
- 2- ضيق الفتحة المهبلية نتيجة لاختلاط جروح مهبلية او ان تكون الفتحة مسدودة كما -2
- في الانثى الرتقاء
- 3- الأورام والفتوق في المهبل او ما يجاوره

الاسباب الجسمانية العامة للعنة ::

- 1- داء السكري ومتلازمة كشنك

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

الشلل النصفي والصلاب المنتشر والصلب الاشرم الجسيم و الافات -2
الانضغاطية في العمود الفقري والحبل الشوكي

الصلاب الضموري العضلي الجانبي -3

السرطانات وفقر الدم الشديد -4

الالتهاب الكلوي المزمن ومرض السفلس -5

العنة النفسانية: الشائع منها هو **النوع الوقتي** الذي تحصل فيه العنة لوقت محدود ثم تزول بزوال السبب، وأكثرها شيوعا العنة الوقتية الحاصلة ليلة الزفاف. وعلاجها بان يغير العروسان مكانهما. وتحصل العنة المؤقتة عند المجهدين فكريا وجسمانيا خلال فترة الانجهاه فقط. وقد تحصل العنة عند الزوج تجاه زوجته وقتيا عند حصول خلاف وفي فترة تفاقم الخلاف واشتداده

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

وقد تكون **العنة النفسانية دائمة** كما يحصل عند المصابين بأمراض نفسية مزمنة ومعقدة. وتحصل عند مشتهي المجانس الجبري. **ويتم تشخيص العنة النفسية بعد اقضاء اسبابها العضوية سريريا ومختبريا**

:العقم او العقر

العقم لغويا يعني عدم القدرة على الانجاب ذكرا كان او انثى . فالعنين عقيم لعدم قدته القيام بالمواقعة الجنسية ونقل الحيامن الى مواضع الاخصاب . عند الانثى

:اسباب العنة عند الذكور

عدم بلوغ السن الفسلجي -1

تلف الخصيتين بسبب تليف او تكلس اثر مرض التهابي او خمجي مزمن او حاد, او **2-** اثر رض سحقى شديد, او تعرض الخصيتين للاشعاع. او بسبب الاخصاء كيا بالنار

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

او استئصالهما جراحيا, او بسبب نمو سرطان فيهما. ان تلف خصية واحدة لا يمنع الاخرى من القيام بانتاج الحيامن

قد يكون سبب العقم في الحيامن بعد انتاجها كأن تخلق مشوهة شكلا او -3 تركيبا او انها شحيحة العدد او ضئيلة الحركة والنشاط والقوة

انسداد الحبال المنوية على الجهتين وقد يكون سبب الانسداد مرضيا او -4 جراحي الطبيعة بناء على طلب الذكر نفسه

:اسباب العقم عند النساء

تكون الانثى عقيما قبل سن البلوغ الوظيفي وبعد بلوغ سن اليأس واثناء -1 الحمل, وعند بعض النساء اثناء فترة الرضاعة

تليف المبيضان بسبب التهابي او خمجي او تليفي او تكلسي او تكيسي عام -2

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

انسداد قناتي فالوب مرضيا او جراحيا وفي احيان نادرة خلقة, فلا تنتقل البيضة -3 الى الرحم

انسداد عنق الرحم خلقة او اكتسابا, عدم اكتمال خلقة الرحم او تشوهه -4.
التطبيقات الطبية القضائية للعقم لا تختلف عن تلك التي وردة في وقائع العنة

الشذوذ الجنسي:

يعني اي ممارسة توصل الى بلوغ اللذة الجنسية بطريق غير الوقاع الجنسي الاعتيادي. والشذوذ الجنسي قد يكون السبب في طلب التفريق(الطلاق) , فقد تتهم انثى زوجها بممارسة عمل جنسي شاذ معها تقوم عليه دعوى طلب التفريق. اهم حالات الشذوذ الجنسي

فرط الاستمناء: قد يكون من دواعي طلب الزوجة التفريق لأنها تنشد العمل -1 الجنسي السوي, وفرط الاستمناء حالة نفسية

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

الفرجسية (عشق الذات) :- وهي حالة ينصرف فيها الشخص، ذكرا كان او انثى، **2-** الى عشق ذاته ويهمل الآخرين وهي حالة نفسية بحث

الوثنية الشهوانية:- وهي حالة حصول التهييج الجنسي او بلوغ اللذة الجنسية **3-** عند النظر، او الحصول على، واحد من خصوصيات الجنس الاخر او النظر الى عضو من اعضائه او قطعة من ملابسه. يتضمن هذا الشخص بوقعة طبية قضائية متى ما حيل بينه وبين الذي يشتهييه او يثيره جنسيا او قوبل بمقاومة عند محاولته الحصول على ما يبتغيه

اشتھاء الميت:- ويقصد به مواجهة الميت لبلوغ اللذة الجنسية.. حيث يعمد الشاذ **4-** من هذا النوع الى قتل ضحيته ثم يستلذ بمواقعتها بعد الموت

الولع بالحيوان:- ويتم فيها المواقعة الجنسية مع الحيوانات الاليفة كالحمير **5-** والبغال والقطط والكلاب وما شاكل

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

الهيام بالصغار والمسنين:- وهي قد تكون اساسا لواقعة طبية قضائية ان **6-** افضى الهيام الى افتضاخ طفلة او الى الاذى الجسماني

:- الشبق الالمي: وتتميز فيه حالتان **7-**

ا- السادية: ويقصد بها انزال الاذى المعنوي او الجسدي في الجنس او الطرف المقابل لبلوغ اللذة الجنسية. وقد تبدأ بأذى معنوي بسيط لا يتعدى القذف او السب ثم يتطور الى الاذى الجسماني البسيط كالقرص او العض, حتى يبلغ اقصى مراحلها عندما يقتل السادي ضحيته لكي يبلغ اللذة. وسبب التسمية تعود للكاتب الفرنسي الفونس فرانسواز ساد الذي كان يمارسها وينوه عنها في كتاباته. تأتي اهمية السادية في حالة تعدد وتعاقب الضحايا مع وجود علامة او علامات مميزة تشير الى طبيعة وطرز تنفيذ العمل الذي يدل على الاتجاه السادي للفاعل.

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

ب- الماسوخية:- وهي نقيض الحالة السابقة حيث يتقبل فيها الفاعل الاذى المادي و المعنوي من الطرف المقابل اثناء العمل الجنسي لكي يبلغ اللذة الجنسية. ابسط انواعها تقبل الالفاظ البذيئة والشتيم من الطرف المقابل واشد حالاتها تقبل الضرب المبرح بالسياط او الاالا الراضة والجارحة وحتى الضغط على الرقبة. سبب التسمية هو نسبتها للشاعر النمساوي البارون ليوبولد فون ساشر ماسوخ

يجب ان لا يغرب عن البال ان الافراد يبدون ميولا اما سادية او ماسوخية في تصرفاتهم الجنسية بدرجة او اخرى ولكنها في العادة تافهة لايعتد بها او انها غير مميزة بحيث يعتبر الفرد طبيعيا من الناحية الجنسية

اشتھاء المجانس:- يقصد به عشق الذكر للمذكر وعشق الانثى للانثى. تنتهى -8 اقصى حالاته عند الذكور باللواط. واقصى حالاته بين الاناث بالسحاق. يصنف :-: مشتهي المجانس الى اربعة اصناف

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

الفضوليون او العابرون او المستكشفون:- وهم الافراد اللذين يمارسون العمل -1- الجنسي الشاذ لمعرفة ماهيته ودرجة اللذة فيه, او انهم يكرهون على ممارسته, او اللذين يمارسونه اعتقادا منهم بضرورة ممارسة على سبيل التجربة و معرفة المجهول. وهؤلاء يمارسونه, في العادة, لمرة واحدة او اكثر وبدون رجعة

المحرومون والمعرزلون:- وهم المظطرون لممارسة هذا النوع من الاتصال -2- الجنسي الشاذ بسبب الحرمان وعدم الاتصال او ملاقة الجنس الاخر في اي مجتمع مهما صغر او كبر. كما يلاحظ بين البحارة وبين السجناء لمدد طويلة ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات الاسرى ايام الحروب. غالبا ما يتخلص افراد هذه الفئة من العمل الجنسي الشاذ بمجر اختلاطهم او ملاقاتهم الجنس الاخر

فئة المجبرين او المرغمين: هم الفئة التي لاتفهم من العمل الجنسي الا الواقعة -3- الشاذة وبرغبة جامحة, ولا يوجد في مخيلتهم اي تصور او ادراك او رغبة للقيام

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

بالعمل الجنسي السوي مع الجنس الآخر. فهم الذين يشابهون قوم لوط واقعا

اللواط (السدومية)

يستعمل لفظ اللواط اصلا للدلالة على المواقعة الشرجية بين الذكور نسبة لما كان يفعله قوم لوط ثم توسع المفهوم بحيث يدل على المواقعة الاستية ذكرا كان المفعول به ذكرا او انثى

الاست او الشرج هو الفتحة السفلى للقناة الاستية, يقع على بعد 4 سم اسفل وامام ذروة العصص في الشرج ما بين الاليتين. يتميز الجلد المحيط بالشرج(الفتحة الاستية) بنمو شعر قليل فيه عند الذكور دون الاناث, وبلونه الداكن ومظهره المتجدد بحيث يبدو التجعد عند الفحص على هيئة ثنيات نصف دائرية اشعاعية المظهر تتمركز عند الاست بحيث يكون الاست تام الغلق في الاحوال الاعتيادية بفعل المصبرات الشرجية الارادية والا ارادية فلا يسمح حتى ولا الغازات بالمرور عبر الاست

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

تزول الثنيات الجلدية مؤقتا في الاحوال الاعتيادية الطبيعية عند ارتخاء وتمطط الاست و توسعه اثناء مرور الغائط من خلاله وعند الفحص الاصبعي وعند الفحص بمنظار القولون. ويحصل نفس الامر عند اللواط الاختياري بين البالغين. **ولذا فان الغالبية العظمى من حالات اللواط ينذر ان يشاهد فيها الطبيب اي ضرر عياني في الاست والمنطقة الشرجية المحيط به.** متى ما زاد حجم الجسم المار عبر الاست في كل الاحوال السابقة عن اقصى مدى لتوتر الجلد او العروق الدموية, او المصبرات الخارجية والداخلية للشرج, فانه سيترك اثرا قد يكون جلديا سحجيا. وقد يكون كدمة موضعية, او ان يكون الضرر جرحا رضيا يمكن ان يمتد للانسجة العميقة.

العلامات الموضعية للواط: يعتمد ظهور الاضرار الموضعية للواط على عدة عوامل اهمها التفاوت بين حجم القضيب وفتحة الاست, وتشنج المصبرات الاستية,

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

واستعمال الملطفات. وعليه فان اللواط ما بين البالغ ذو القضيب المنتصب واست الطفل الصغير, او للواط القسري والعنيف كالذي يحصل مصحوبا بمقاومة وكفاح شديدين, يترك اثارا واضحة مميزة

-:اضرار اللواط الحاد المنجز من عهد قريب

ا- **سحجة طولية توازي الثنيات الاستية** وتمتد من الجلد المحيط بالاست وحتى الفتحة الاستية. وقد تمتد لتشمل الغشاء المخاطي المبطن للقناة الاستية. ويكون هذا السحج متوضعا في العادة في متوسط الجزء العصعصي من الاست. وقد يتوضع في اماكن عدة وحسب وضعية الفاعل والمفعول به

ب- **قد يترافق السحج بكدمة بقعية او كدمة تحيط بالاست**

ج- **ضرر جرحي رضي عميق يمتد الى المصرة الاستية , وهو امر نادر الحصول.**

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

تكون الاضرار مصحوبة بالم في الاست ويكون من النوع التشنجي ومردة التمزقات والخزب الموضعي وما يرافق ذلك من ضرر وضغط على الاعصاب الحسية المنتشرة في المنطقة

علامات اللواط المزمنة. وتشاهد عند ممتهني اللواط او المأبونين, وهي متعددة ومتباينة. ان تكرار اللواط لا يشترط به ان يترك اثرا حتى ولو تكرر لبضع مئات من المرات. اهم علامات اللواط المزممن

**تثخن الجلد المحيط بالاست, وبريقة , بسبب دوام الاحتكاك ما بين 1-
القضيب المنتصب والشرح**

**زوال الثنيات الجلديه, وسببه ضمور وزوال النسيج الشحمي تحت الجلد 2-
المحيط بالمنطقة الاستية. وينعكس ذلك بمظهر قمعي او مخروطي
للشرح المحيط بالاست**

الفصل الحادي عشر: الأمور الجنسية

- 3- تلف المصبرات الاستتية الارادية والارادية بحيث تتوسع الفتحة الاستتية وتفقد السيطرة على غلق الاست.
- 4- زوال المنعكس الاستتي-الشرجي الناتج عن تلف الاعصاب الحسية. فعند تحفيز المنطقة ميكانيكيا يتوسع الاست بعد تفلص ضئيل في المنطقة. بينما يستمر التقلص عند الفحص الاعتيادي.
- 5- وجود التقرحات والاورام التناسلية في الشرج والاست.